



S.O.S. PIDOCCHI

Prevenzione e Trattamento



Come si capiscono se ci sono i pidocchi?

Normalmente la prima cosa che si nota è la presenza di uova, ben visibili dietro le orecchie ed alla base del collo.

I pidocchi adulti sono invece difficili da individuare. La presenza di pidocchi dev'essere sospetta anche quando si trova, sul cuscino, una polvere secca nera, o residui grigiastri.

Spesso è il prurito alla testa, dovuto alle morsicature degli insetti, che induce la persona a grattarsi intensamente a far sospettare la presenza di pidocchi.

Come si frena il propagarsi dell'infestazione

- 1) Prima di tutto intervenire con l'applicazione di un prodotto farmacologico specifico contro i pidocchi. Le piretrine sinergizzate e la permetrina all'1% sono i trattamenti che per il loro profilo di efficacia e sicurezza devono essere considerati di 1a scelta.
- 2) Far seguire il trattamento farmacologico contro i pidocchi l'uso frequente di un pettine a denti molto fini per rimuovere le lendini non più vitali.
- 3) Controllare accuratamente ogni 2-3 giorni i componenti del nucleo familiare e le altre persone che possono essere entrate in stretto contatto con il soggetto infestato.
- 4) Lavare con acqua bollente i tessuti che il soggetto infestato può aver toccato nei due giorni precedenti il trattamento (indumenti personali, biancheria da letto, asciugamani).
- 5) Lavare pettini, spazzole e fermagli dopo averli immersi per 1 ora in acqua bollente con detersivo.
- 6) Non utilizzare in comune pettini, spazzole o cappelli.
- 7) Conservare in un sacchetto di plastica per due settimane gli oggetti o giocattoli (ad es. animali di peluche) che non possono essere lavati in acqua o a secco.
- 8) Non serve a nulla tagliare i capelli.



Va ricordato inoltre che:



- 1) Se, dopo 8-12 ore l'applicazione del prodotto, qualche insetto è ancora visibile ma i suoi movimenti sono lenti, non occorre ripetere il trattamento.
- 2) Se invece, non sono rintracciabili insetti morti e si ha l'impressione che gli insetti siano vitali come prima, è consigliabile consultarsi con il proprio operatore sanitario.
- 3) Non trattare le persone infestate più di 3 volte con lo stesso prodotto. Nel caso che il trattamento risultasse inefficace, consultare il proprio medico o farmacista per un intervento alternativo.
- 4) Non utilizzare contemporaneamente o mescolare insieme prodotti diversi, indicati contro i pidocchi.
- 5) E' utile controllare i capelli e passarli con un pettine a denti fini ogni 2-3 giorni per 2-3 settimane, sino a quando non si è sicuri di aver eliminato completamente gli insetti e le uova.

Per ulteriori informazioni sulla pediculosi collegarsi a: www.ilpidocchi.it